

Дата осмотра:

ФИО: муж жен Дата рождения:

Анамнез и общий осмотр

Жалобы на: сыпь зуд боль изменение ногтей выпадение волос сухость кожи
 выделения из половых органов

Перенесенные и сопутствующие заболевания: туберкулез сифилис ВИЧ диабет
 гепатит хеликобактер гипо(гипер)тиреоз глистная инвазия пищевая аллергия
лекарственная аллергия контактная аллергия сезонная аллергия онкология
отрицает

Аллергический и эпидемиологический анамнез: химические вещества новая
косметика растения животные свежее мясо(рыба) новые пищевые продукты
медикаменты длительное УФО укусы насекомых люди с подобными высыпаниями
случайная половая связь туристическая поездка отрицает

Семейный анамнез: подобная сыпь имеется у: всех членов семьи отца матери
братьев (сестер) родственников нет

Вредные привычки: отрицает курение алкоголь наркотики

Длительность заболевания: часы дни недели месяцы год и больше не
помнит

Возраст начала заболевания: с рождения грудной детский подростковый
молодой зрелый пожилой

Начало заболевания:

Течение заболевания: острое постепенное дебют персистирующее
рецидивирующее циклическое сезонное

Предыдущее лечение: нет самостоятельное назначенное врачом без изменений
 улучшение ухудшение

Периферические лимфоузлы: увеличенные болезненные гиперемированные
симметричные односторонние заушные подчелюстные околоключичные нет
подмышечные паховые полиаденит лимфангит

Кожные покровы

Фототип кожи: I II III IV V

Дермографизм: белый красный уртикарный

Цвет: телесный желтый серый эритродермия

Гипергидроз: нет локальный генерализованный

Ксероз: нет локальный генерализованный

Температура: нормальная субфебрильная фебрильная

Характеристика и распространение сыпи: мономорфная полиморфная
ложнополиморфная единственный элемент локализованный очаг региональная
распространенная генерализованная красный человек

Расположение сыпи: симметричное одностороннее открытые участки закрытые
участки в складках в местах давления периорбитальное периоральное
периартикулярное перианальное акральное по дерматомам по линиям Блашко по
линиям Лангера сгибательная поверхность разгибательная поверхность
фолликулярное споротрихоидное феномен Кебнера симптом бабочки

Конфигурация сыпи: сгруппированная линейная змеевидная завитая сетчатая
 кольцевидная монетовидная мишеневидная дугообразная полициклическая
рассеянная не определена

Локализация

Голова: волосистая часть лоб висок брови веки конъюнктивa щеки нос носогубная складка губы подбородок область бороды и усов ушная раковина заушная складка наружный слуховой проход

Полость рта: слизистая щек слизистая губ десны язык подъязычное пространство твердое небо зев

Туловище: передняя часть шеи задняя часть шеи плечи подмышечные впадины грудь бок туловища молочная железа сосок и (или) ареола субмаммарные складки живот пупок верхняя часть спины нижняя часть спины

Верхние конечности: плечо локоть локтевая ямка предплечье тыл кисти запястье ладонь пальцы рук межпальцевые промежутки

Аногенитальная область: лобок паховые складки ствол полового члена крайняя плоть головка полового члена отверстие уретры мошонка большие половые губы малые половые губы промежность анус межягодичная складка ягодицы

Нижние конечности: бедро колено подколенная ямка голень лодыжка тыл стопы подошва пальцы ног межпальцевые промежутки

Элементы сыпи

Пятно

Диаскопия: побледнение (исчезновение) без изменений

Характер: воспалительное эритематозно-сквамозное геморрагическое ливедо телеангиоэктазия цианоз пигментное гипо(де)пигментное некроз искусственное

Размер: макула розеола эритема петехия пурпура вибицес экхимоз до 1 см 1-5 см более 5 см

Границы: четкие нечеткие

Цвет: розовый красный вишневый пурпурный фиолетовый синюшный желтый оранжевый белый коричневый черный

Шелушение: нет поверхностное в центре по периферии эксфолиация

Форма: круглая овальная неправильная асимметричная кольцевидная линейная

Симптомы: стружки Дарье-Унны Бальцера

Папула

Диаскопия: побледнение (исчезновение) без изменений яблочное желе феномен пылинок изменение на коричневый цвет

Характер: воспалительная пальпируемая пурпура невоспалительная пигментная гипо(де)пигментная искусственная

Размер: милиарная лентикулярная нуммулярная бляшка комедон до 0,2 см 0,2-1 см 1-2 см более 2 см

Границы: четкие нечеткие

Цвет: цвета кожи розовый красный вишневый пурпурный фиолетовый голубой желтый оранжевый белый коричневый черный

Шелушение: нет поверхностное в центре по периферии

Поверхность: гладкая эрозированная вегетации гиперкератоз серопапула зернистость (грануляции)

Форма: круглая овальная неправильная полигональная кольцевидная линейная плоская полушаровидная шаровидная остроконечная филиформная кратерообразная пупковидная фолликулярная перпендикулярная на ножке

Симптомы: псориатической триады Дарье-Унны облатки скрытого шелушения пурпуры коллодийной пленки терки Бенье-Мещерского дамского каблука зонда Поспелова ямки Фитцпатрика сетки Уикхема апельсиновой корки

Узел

Характер: воспалительный невоспалительный обменный

Границы: четкие нечеткие

Цвет: цвета кожи красный вишневый пурпурный фиолетовый голубой синюшный коричневый черный

Поверхность: гладкая эрозированная кратерообразная

Подвижность: подвижный спаянный с кожей неподвижный

Консистенция: мягкая тестоватая плотная

Симптомы: ямки Фитцпатрика апельсиновой корки

Волдырь

Цвет: розово-красный фарфорово-белый

Форма: круглая овальная неправильная кольцевидная

Отек

Характер: аллергический лимфатический травматический дерматосклероз

Цвет: телесный красный синюшный

Симптомы: апельсиновой корки

Везикула

Содержимое: серозное геморрагическое

Основание: эритема папула неизменная кожа

Симптомы: носовой Гетчинсона росы на лепестке розы

Пузырь

Содержимое: серозное геморрагическое гнойное

Строение: однокамерный многокамерный

Основание: эритема неизменная кожа

Форма: плоская полушаровидная округлая неправильная

Покрышка: напряженная вялая плотная тонкая

Симптомы: Никольского груши Азбо-Ганзена гипопиона ожерелья

Пустула

Характер: остиофолликулит фолликулит фликтена акне эктима рупия фурункул карбункул абсцесс

Расположение: фолликулярная нефолликулярная

Форма: остроконечная плоская полушаровидная

Размер: 1-2 мм 3-5 мм более 5 мм

Симптомы: гипопиона сита медовых сот

Чешуйка

Размер: муковидная отрубевидная пластинчатая листовидная 1-2 мм до 1 см более 1 см

Цвет: полупрозрачный белый серебристый серый буро-желтый серо-черный

Консистенция: рыхлая плотная

Отторжение: легкое с трудом

Корка

Характер: серозная гнойная серозно-гнойная геморрагическая струп

Цвет: серо-бурый медово-желтый серый коричневый черный

Консистенция: рыхлая плотная слоистая

Форма: плоская бугристая неправильная блюдце устрица

Симптом: Арди-Горчакова ромба Михаэлиса

Трещина: поверхностная глубокая

Экскориация: поверхностная глубокая линейная полосовидная овальная

Эрозия

Размер: мелкоточечная до 1 см 2-5 см более 5 см

Форма: овальная неправильная полициклическая

Дно: экссудация фиброзный налет гнойный налет

Симптом: серозных колодцев

Язва

Размер: до 1 см 2-5 см более 5 см

Форма: круглая овальная неправильная полициклическая

Дно: экссудация фиброзный налет гнойный налет гладкое неровное
грануляции вегетации

Края: мягкие твердые подрывные отвесные валикообразные блюдцеобразные

Периферия: твердый инфильтрат мягкий инфильтрат

Вегетация: папилломатозная веррукозная петушиный гребень цветная капуста
нитевидная

Лихенификация: гладкая шелушение эксфолиации

Атрофия

Характер: поверхностная (эпидермальная) глубокая (дермальная) анетодермия
атрофодермия пойкилодермия

Форма: круглая овальная неправильная линейная плоская вдавленная
грыжевидная

Цвет: телесный белый коричневый

Симптом: папиросной бумаги кнопки звонка

Рубец

Характер: нормотрофический гипертрофический атрофический келоид

Форма: круглая овальная неправильная линейная плоская вдавленная
причудливая звездчатая мозаичная

Цвет: телесный белый коричневый

Склероз: локальный распространенный генерализованный

Ход: плоский возвышенный линейный извитой гладкий чешуйчатый
Симптом Сезари

Ямка: углубление синус свищ

Алопеция

Характер: рубцовая нерубцовая гипотрихоз

Распространение: очаговая многоочаговая диффузная по мужскому типу по
женскому типу тотальная универсальная

Форма: круглая овальная неправильная ленточная

Локализация: лобная теменная правая теменная левая затылочная брови
ресницы

Уровень: на уровне кожи на 4-6 мм от кожи на одном уровне на 2-3 мм на разном
уровне

Симптомы: мех изъеденный молью Хертога Пинкуса зона расшатанных волос
положительный тест натяжения

Гипертрихоз

Характер: локальный ланугоинозный гирсуитизм

Гирсутное число: до 8 9-16 17-25 более 25

Изменение волос: полиоз перхоть гниды волосаяная муфта узелки в виде бус
бамбуковый волос расщепление волоса перекрученный волос кольчатый волос
шерстеподобный волос

Изменение ногтей

Локализация: левая кисть I II III IV V

правая кисть I II III IV V

левая стопа I II III IV V

правая стопа I II III IV V

Изменение: формы ногтя деформация ногтя цвета ногтя подногтевого ложа ногтевых валиков

Цвет: белый серый желтый зеленый коричневый черный

Расположение: поверхностное дистальное проксимальное линейное

Характер: лейконихия меланонихия эритронихия брахионихия трахионихия койлонихия онихолизис онихорексис онихошизис онихауксис онихомадезис онихогрифоз птеригиум паронихия подногтевой гиперкератоз клещевидный ноготь акроостеолиз экзостоз

Симптомы: Бо Мюрке Терри наперстка масляного пятна барабанных палочек клюва попугая елочки Гетчинсона

Выделения из половых органов: нет обильные скудные слизистые слизисто-гнойные гнойные творожистые

Методы исследования

Свечение под лампой Вуда: голубовато-белое белое тусклое ярко-сине-белое тускло-голубое голубовато-зеленое желто-зеленое зеленое оранжево-красное тускло-желтое оранжево-желтое кораллово-розовое

Ацето-тест: положительный отрицательный

Дерматоскопия

Рисунок: сетчатый глобулярный гомогенный звездчатый булыжный параллельный многокомпонентный лакунарный неспецифический

Цвет фона: розовый красный желтый (оранжевый) пурпурный серый голубой коричневый черный

Сеть: нет регулярная атипичная черная пятнистая негативная псевдосеть

Точки и глобулы: правильные коричневые неправильные коричневые радиальные коричневые серые сине-серые

Кляксы: правильные центральные неправильные периферические неправильные сине-серые

Структура: равномерная глобулярная периферическая глобулярно-сетчатая центральная глобулярно-сетчатая симметричная глобулярно-сетчатая глобулярно-гомогенная бело-голубая колесо-подобная листовидная в виде отпечатков пальцев в виде перца коралло-подобная

Полоски: регулярные нерегулярные лучи псевдоподии

Край: резкая граница изъеденный молью

Гипо(де)пигментные признаки: центральные бесструктурные области периферические бесструктурные области структуры регресса центральное белое пятно розетки блестящие белые области кристаллическая структура

Особые признаки (лицо): кольцевидная гранулярная пигментация асимметрично пигментированные фолликулы ромбовидные структуры разрушенные фолликулы угловые линии

Особые признаки (ладони и подошвы): параллельный бороздчатый рисунок параллельный гребешковый рисунок решетки (кружевной рисунок) фибриллярные (волоконистые) структуры

Непигментные признаки: милиаподобные кисты комедоно-подобные отверстия мозговидные структуры желто-белые дольчато-подобные структуры изъязвление желтые облака гомогенные желтые области желтые чешуйки бело-серые чешуйки слюдоподобная структура радуга

Сосуды: в виде шпильки в виде запятой в виде клубочков в виде штопора в виде нити жемчуга в виде винограда в виде короны ветвящиеся линейно-извитые неправильные точечные (пунктирные) полиморфные регулярные кластерные кольцевидные Пятнистые радиальные центральные розовая вуаль красно-синие лакуны

Трихоскопия

Волосы: кольцевидные в виде восклицательного знака дистрофические разного диаметра миниатюрные в виде запятой в виде зигзагов в виде пламени в виде штрих-кода пучковые обломанные множественные незрелые

Точки и пятна: желтые точки черные точки белые точки белые пятна перифолликулярная эритема перифолликулярные серо-голубые точки

Онихоскопия: серые полосы коричневые полосы параллельные полосы розовые полосы пигментная лента неправильные глобулы и пятна капилляры ногтевого валика